

# **NORMAS QUE CUMPLIR ANTE LA PRESENCIA DE ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A CARBAPENEMES O PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS**

## **I. Introducción**

La emergencia y riesgo de diseminación de enterobacterias resistentes a Carbapenemes o productoras de carbapenemasas, a partir de los aislamientos en el Laboratorio Central y Laboratorios bacteriológicos de algunos hospitales surge la necesidad de normatizar cuidados preventivos en la atención de pacientes con estos gérmenes. KPC(klepsiella pneumoniae productora de carbapenemasa) y Enterobacter resistente a Carbapenemes.

### **Precauciones de contacto**

Los pacientes deben estar en habitaciones individuales o en aislamiento en cohorte, es decir, colocar en una misma habitación 2 ó más pacientes colonizados/infectados con KPC.

**Higiene de manos** antes y después de tocar al paciente y su entorno inmediato.  
Cumplir con los 5 momentos siempre.

### **Bata y guantes**

- El personal de salud que atiende al paciente debe vestir bata y usar guantes, los mismos deben ser desechados al término de su utilización.
- La bata usada debe ser desechada, no se debe volver a usar nuevamente con el mismo paciente ni con otro paciente.
- El personal no debe salir de la habitación del paciente infectado o colonizado con **los guantes y la bata con que e está atendiendo al paciente**. Si Necesita salir, debe desecharlos, y colocarse unos nuevos al volver a entrar.

**Elementos, insumos o cualquier otro dispositivo** que se encuentran en la sala del paciente colonizado o infectado no deben ser trasladados a otra habitación de paciente no afectado.

**Contar con todo lo que el paciente necesita**, en cantidad suficiente en la habitación y reponer lo que se usa todas las veces que fuere necesario para evitar salir de la habitación a buscar el insumo.

**Limpieza terminal:** Al alta (óbito o traslado) del paciente colonizado o infectado, todos los insumos descartables que quedaron dentro de la habitación y no fueron usados, aunque no se hayan abierto, deben ser desechados. Los reutilizables deben ser adecuadamente descontaminados, esterilizados, y toda habitación: paredes, pisos, cama, puertas, monitores, respirador, bombas de infusión, ventanas, etc. Deben ser profundamente limpiados y descontaminados.

**Traslado del paciente:**

- Limitar el traslado de estos pacientes. Si fuera inevitable, el personal que lo traslada deberá colocarse el equipo de protección individual (Bata y guantes).
- Si el paciente se deriva a otra sala y/o institución se debe avisar a médicos y enfermeras de la otra sala o Institución que el paciente se encuentra colonizado/infectado por KPC y de las precauciones que están siendo tomadas. Este dato debe estar escrito en la H Clínica u hoja de remisión del usuario.

**Restricción de visitas:** Responsabilidad de todo personal de salud del servicio afectado (jefes médicos y enfermería, médicos residentes, enfermeras asistenciales, ECI)

**Informar a la familia** de las medidas adoptadas para los pacientes colonizados.