

Dengue - Flujograma de envío de muestras

Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Envío de muestras desde hospitales especializados

- **Hospitales Especializados con capacidad de diagnóstico por IgM de captura:**
Etapas de Silencio epidemiológico y alerta: Enviar al LCSP todos los positivos y todas las viremias hasta tener confirmación de serotipo circulante en su área de competencia.
Etapas de Epidemia o Brote: Durante la epidemia enviar el 10% de los positivos y el 100% de los casos graves y fatales.
- **Regiones Sanitarias con capacidad de diagnóstico por IgM de captura**
Etapas de Silencio epidemiológico y alerta: Enviar al LCSP todos los positivos y todas las viremias hasta tener confirmación de serotipos circulantes de su Región.
Etapas de Epidemia o Brote: Enviar el 10% de los positivos y el 100% de los casos graves y fatales. Una vez confirmado el serotipo enviar el 10 % de las viremias para vigilar el serotipo circulante.
- **Regiones sin capacidad de diagnóstico por IgM de captura**
Etapas de Silencio epidemiológico y alerta: Enviar al LCSP el 100% de las muestras sospechosas para IgM de captura y viremias.
Etapas de Epidemia o Brote: Una vez confirmados los casos en la Región enviar el 10 % de los casos sospechosos para IgM y el 10 % de las viremias para vigilar el serotipo circulante y el 100% de los casos graves y fatales.